

CLIPPERTON

K 220

Mocny w ziarnie i kiszonce

Profil

CLIPPERTON to wczesna, bardzo plenna kukurydza na kiszonkę. Odmiana zarejestrowana w Holandii i polecana do uprawy w tym kraju. Wysokie plony w połączeniu z wczesną dojrzałością i dobrą jakością paszy sprawiają, że odmiana ta jest atrakcyjna dla regionów o wczesnym dojrzewaniu lub jako uprawa następcza po Mieszance Gorzowskiej, życie na zielonkę lub COUNTRY 2051.
Wyróżnia ją dobra tolerancja na warunki pogodowe, zdrowotność oraz szybki rozwój początkowy i dobry stay-green. Sprawdza się również w uprawie na ziarno.

- Wysoki plon całkowity suchej masy
- Wysoki plon energii i skrobi
- Niska podatność na zgniliznę łodyg

Charakterystyka ogólna

Użytkowanie	
Dojrzałość kiszonkowa	wczesna
FAO (kiszonka)	220
Typ ziarna	pośredni
Data siewu	wczesny | późny

Cechy agronomiczne

Wysokość roślin	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(wysokie)
Wrażliwość na chłody w stadium siewki	1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9	(niska)

Skłonność do

Rozkrzewiania	1 **(2)** 3 4 5 6 7 8 9	(bardzo niska do niskiej)
Wylegania (kiszonka)	1 2 3 **(4)** 5 6 7 8 9	(niska do średniej)

Właściwości plonu

Całkowita sucha masa	1 2 3 4 5 6 7 **(8)** 9	(wysoka do bardzo wysokiej)
Plon energii	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(wysoki)
Zawartość skrobi	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(średnia do wysokiej)
Strawność	1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9	(średnia do wysokiej)
Wydajność biogazu	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(wysoka)
Plon biogazu	1 2 3 4 5 6 **(7)** 8 9	(wysoki)

Podatność

Zgnilizna łodygi	1 **(2)** 3 4 5 6 7 8 9	(bardzo niska do niskiej)

Klasyfikacja hodowcy: +++ = bardzo dobra / bardzo wysoka | ++ = dobry / wysoki | + = średni

Odporność na choroby

Głownia guzowata	+ ○ ○
Brunatna plamistość liści (DTR)	+ ○ ○

Stanowisko

Rodzaj gleby



Wilgotność



Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 11/2025 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.