

# RODILLO

Życica westerwoldzka

## Profil

**RODILLO** to najnowsza diploidalna życica westerwoldzka DSV. Ponieważ **RODILLO** wysoko plonuje już przy pierwszym pokosie, zarówno jako roślina okrywowa, jak i jako roślina główna, jest bardzo atrakcyjną odmianą do siewu jako roślina okrywowa jesienią, zbioru przed zimą, a następnie dwu- lub trzykrotnego zbioru wiosną następnego roku. Następnie można wysiać rośliny jare, takie jak wczesna odmiana kukurydzy lub sorgo. Ponadto RODILLO charakteryzuje się doskonałą odpornością na rdzę i wyższą wartością paszową niż starsze odmiany.

**Ilość wysiewu:** 40-50 kg/ha

- Nadaje się do łączonej uprawy okrywowej i głównej
- Dobra odporność na rdzę
- Poprawa wartości paszowej

## Przydatność

| | |
|---|---|
| **Ploidalność** | diploid |
| **Dojrzałość** | średnia |

## Cechy agronomiczne

| | | |
|---|---|---|
| **Termin kłoszenia** | 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 | wczesny i średni |
| **Uprawa współrzędna - wczesny rozwój wzrostu** | 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 | średnia |
| **Rozwój początkowy** | 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 | średnia |

## Skłonność do

| | | |
|---|---|---|
| **Wylegania** | 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 | średnia |

## Właściwości plonu

| | | |
|---|---|---|
| **Wydajność suchej masy** | 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 | średnio-wysoka |
| **Plon suchej masy - I pokos** | 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 | średnio-wysoka |
| **Plon suchej masy – kolejne pokosy** | 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 | średnio-wysoka |
| **Uprawa współrzędna - Plon suchej masy 1. pokos** | 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 | średnio-wysoka |

## Podatność

| | | |
|---|---|---|
| **Rdza** | 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 | niska do średniej |

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2024 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.